

## Anamnesefragebogen Falldefinition A/H5 Stand: 01.03.06

Anzuwenden bei allen Patienten mit Verdacht auf Atemwegsinfektionen; von den aufnehmenden MitarbeiterInnen (Pfleger) zu Beginn zu erfragen, um diese Patienten im positiven = Verdachtsfall sofort zu isolieren!

1.	ja	nein	2.	ja	nein
- Fieber (>38°C)			- Kontakt mit Vögeln/Geflügel in einem HPAI-Endemie-Gebiet* <sup>1</sup> bis 7 Tage vor Erkrankungsbeginn		
- akuter Krankheitsbeginn			- Aufenthalt auf einem Grundstück mit bestätigter oder V.a. HPAI bei Geflügel/Vögel bis 7 Tage vor Erkrankungsbeginn		
- Husten			- Kontakt mit Menschen, die bestätigt oder V.a. HPAI haben (Reiseanamnese?) bis 7 Tage vor Erkrankungsbeginn		
- Atemnot (Dyspnoe)			- Laborexposition (Beruf?) bis 7 Tage vor Erkrankungsbeginn		

\*<sup>1</sup>HPAI: hochpathogene aviäre Influenza, s. in der Rettungsstelle ausliegende aktualisierte Liste\*<sup>2</sup>

**Mindestens 3 x ja plus mindestens 1 x ja gleich Isolierraum**

Rettungsstelle/zentrale Aufnahme/Notaufnahme

**Pat. mit OP-Mund-Nasen-Schutz versorgen, in den Isolierraum führen und diensthabenden Internisten rufen! (Bitte beruhigend ohne Panikmache dem Pat. erklären: V.a. Influenza – nicht das Wort Vogelgrippe benutzen! – daher Schutzmaßnahmen)**

Wenn die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird der Patient im Rahmen der Standard-Routine weiterbehandelt/versorgt.

### 3. Patient wird umgehend im Isolierraum separiert.

Alle weiteren Untersuchungen/Maßnahmen werden nur noch von dem sog. **Infektionsmitarbeiter** (Schwester oder Pfleger) oder dem sog. **Infektionsarzt** in Schutzkleidung (Kittel, OP-Mund-Nasen-Schutz, Schutzhaube ggf. Schutzbrille) durchgeführt.

#### 4.1 Influenza-Schnelltest

1 Rachen- und 1 Nasenabstrich  
Tupfer ohne Transportmedium

Testergebnis	
positiv	negativ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.2 Influenza-Test im Referenzlabor (RKI Berlin)

1 Rachen- und Nasenabstrich  
Tupfer in Virustransportmedium  
wenn nicht vorhanden, Tupfer ohne Transportmedium

Probentransport über den Laborverbund der hospital Dienstleistung + Beratung GmbH anmelden.

#### 4.3 In der Pandemischen Warnphase wird bei Erfüllung der Falldefinition unabhängig vom Ergebnis des Influenza-Schnelltestes der Patient stationär aufgenommen!

Aufnahme-Station

(Räume .....)

	ja	nein
→ Information des sog. Ausbruchteams über die Krankenhauszentrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Meldung des Verdachtsfalls an das zuständige Gesundheitsamt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.4 Zimmerkennzeichnung

Bis zum Vorliegen der endgültigen Ergebnisse aus dem Referenzlabor darf das Zimmer nur unter Beachtung der im Formblatt Infektionsprävention Aviäre Influenza FP-KLIP-281 beschriebenen Hygienemaßnahmen betreten werden.

#### Ergebnis des Referenzlabors:

entgegengenommen von:

telefoniert mit:

Datum:

**Dieser Anamnesefragebogen muss von dem Erstuntersucher mit Unterschrift und Datum versehen werden.**

Datum:

Unterschrift:

\*2

Aktuelle Länderliste für Aviäre Influenza:

Aserbaidshon, Australien, Baltische Staaten, Bulgarien, China, Deutschland, Griechenland, Indonesien, Irak, Italien, Japan, Kambodscha, Kasachstan, Korea, Kroatien, Kuwait, Nigeria, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Thailand, Türkei, Ukraine, Vietnam